

ZOLAMOX LA

ENJEKSİYONLUK SÜSPANSİYON
AMOKSİSİLİN



MİKRONİZE EDİLMİŞ
PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜ

DOKU VE SIVILARA
YÜKSEK ORANDA
DAĞILIM



NOVAKİM



ZOLEANT
PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL

zoleant.com.tr

f in @ /zoleant

ZOLAMOX LA

ENJEKSİYONLUK SÜSPANSİYON
AMOKSİSİLİN



KISA SÜREDE ENFEKSİYON KONTROL ALTINDA

- 150 mg/mL amoksisilin (trihidrat olarak) içerir.
- Amoksisilin, penisilin grubuna dahil **bakterisidal** etkiye sahip **geniş spektrumlu** bir antibiyotiktir.
- Bakterilerin hücre duvarındaki peptidoglikan sentezini inhibe ederek **gram pozitif** ve **gram negatif** bakterilere karşı etki gösterir.
- Kas içi veya deri altı uygulamada emilimi iyi olup türlere bağlı olarak uygulamadan **1,5 - 3 saat** sonra plazma pik seviyesine ulaşır.

48 saat ara ile yapılan ikinci uygulamadan sonra farmakokinetik parametreler stabil kalır.

- İlk uygulama sonrasında, 32 saatten daha fazla sürede plazma konsantrasyonu MIC 90 değerinin üzerinde kalır ve ikinci uygulamada bu süre 36 saate kadar çıkar.
- Amoksisilin aktif olarak başlıca böbreklerden atılır.

Sığır, koyun, keçi, kedi ve köpeklerde, geniş bir spektrumda amoksisiline duyarlı gram pozitif ve gram negatif bakteriler tarafından meydana gelen solunum sindirim, ürogenital sistem, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ile postoperatif enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Gebelik ve laktasyonda uygulanabilir.



KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

1 mL/10 kg canlı ağırlık/gündür.

Sığır, koyun ve keçilere derin kas içi yolla, kedi ve köpeklerde ise kas içi veya deri altı yolla uygulanır. 48 saat sonra enjeksiyon tekrarlanmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

50 mL, 100 mL ve 250 mL

Tek Yetkili Distribütör
NOVAKİM İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
0262 751 06 74
www.novakim.com

ZOLEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL
zoleant.com.tr — f in @ /zoleant

Detaylı bilgi için lütfen prospektüsü okuyunuz.