

# SPECTAZOL

ORAL JEL  
SPEKTİNOMİSİN



NEONATAL İSHALLERDE  
KORUMA VE TEDAVİNİN ANAHTARI



NOVAKİM



ZOLEANT  
PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL

[zoleant.com.tr](http://zoleant.com.tr)

f in @ /zoleant

# SPECTAZOL

## ORAL JEL SPEKTİNOMİSİN

**Neonatal dönemdeki kuzu ölümlerinin %84,6'sı doğumdan hemen sonra, ilk hafta içerisinde meydana gelmektedir.**

**Koruma ve sağaltım önlemleri hemen alınmadığı takdirde ishallere bağlı yavru ölümleri ve ekonomik kayıplar büyük olacaktır.**

### SPECTAZOL Oral Jel

50 mg/mL Spektinomisine eşdeğer **spektinomisin dihidroklorit pentahidrat** içerir.

- **Spektinomisin**, aminoglikozit grubu antibakteriyeldir
- Bakteriyel ribozomların 30S alt ünitesine bağlanarak protein sentezini **geri dönüşümsüz inhibe eder ve bakteriyostatik** etki gösterir. Bu nedenle **spektinomisine karşı bakteriyel direnç çok düşük orandadır**
- Diğer antibiyotiklerle arasında çapraz direnç yoktur
- Sindirim kanalı enzimleri ve bakteriyel etkinliklerle parçalanmaz, bu nedenle sindirim sistemi enfeksiyonlarında yeterli düzeyde antibakteriyel etki gösterir

**SPECTAZOL**, kolostrum yoksunluğu riski altındaki dış etkenlere karşı açık bulunan yeni doğan kuzularda bakteriyel neonatal hastalıkların önlenmesi ve tedavisi amacıyla kullanılır.

**E.Coli ve Salmonella** gibi enterobakteriler başta olmak üzere diğer bakterilerin neden olduğu **gastrointestinal sistem hastalıklarına karşı etkilidir.**

**Salyalı ağız hastalığı** koyunculuk işletmelerinde doğumun ilk birkaç günü içerisinde görülen bakteriyel (E. coli) neonatal hastalıktır. Yeni doğan kuzularda; uyuşukluk, memeyi bulamama, emmede isteksizlik, salivasyon artışı, abdominal dilatasyon (karında genişleme) ve mekonyumun atılamaması gibi semptomlarla karakterizedir. Bu hastalık, sürülerde %30'lara varan morbidite ve %80'i aşan mortalite meydana getirir.<sup>1</sup>

**SPECTAZOL hastalığın tedavisi ve önlenmesinde kullanılır.**



### Kullanım Şekli ve Dozu

1 mL (1 pompa) / hayvan başına tek uygulama olarak verilir. Doğumdan sonraki ilk 48 saat içerisinde uygulanır.

Şişeye monte edilen pompa, her basıldığında 1 mL ürün verir.

İlacı kullanmadan önce şişeye monte edilen pompa birkaç kez pompalanarak kanaldaki hava boşluğu alınmalıdır.

### Ticari Takdim Şekli

100 mL

### Referans

1. U. Aydogdu, Kuzularda Neonatal Mortalite. Cumhuriyet Üniv. Sađ. Bil. Enst. Derg. 2016 (1)2:37-46

Tek Yetkili Distribütör  
**NOVAKİM İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş.**  
**0262 751 06 74**  
www.novakim.com

**ZOLEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL**  
zoleant.com.tr — f in @ /zoleant

Detaylı bilgi için lütfen prospektüsü okuyunuz.